

CAVEB C'est plutôt le stade de développement des graminées qui détermine la qualité.

Pâturage : ce n'est pas la hauteur qui compte

Pour savoir si une prairie est bonne à pâturer, la hauteur d'herbe est l'un des critères le plus souvent utilisé. Mais qu'elle soit mesurée à l'herbomètre (pour les plus courageux), à la botte ou à l'œil, ce critère n'est peut-être pas le plus pertinent.

Dans le cadre du projet Life + pâturage tournant dynamique, porté par la Caveb depuis 2014, 35 parcelles de prairies situées en Deux-Sèvres sont suivies de près : rendement annuel, rendement à l'entrée des animaux, hauteur d'herbe, valeur alimentaire de l'herbe, stade de développement des graminées... tous ces critères sont relevés depuis 2015 à chaque tour de pâturage.

L'étude de données collectées montre que la hauteur n'est pas un indicateur de la qualité de la prairie. Lorsque l'herbe est prise au bon stade, la hauteur d'herbe n'a aucune influence sur la digestibilité ou la teneur en MAT. On peut donc avoir une herbe très haute mais de qualité ou très courte et sans valeur ! C'est pourquoi la méthode Herby, qui vise à optimiser la qualité du fourrage, conseille de s'intéresser plutôt au stade de développement des grami-



Lors de ce prélèvement réalisé en Gâtine en mars 2017, les valeurs étaient de 111 PDI et 1,01 UFL.

nées, qui est un bon indicateur de la qualité. « La hauteur permet d'estimer la quantité d'herbe disponible sur la parcelle, mais ne peut pas être utilisée comme un critère de qualité. Celui qui veut faire de la performance animale devrait plutôt regarder le stade de ses graminées », explique Joséphine Cliquet, conseillère pâturage à la Caveb.

Finalement, pour savoir si une prairie est bonne à être pâturée, il faut déjà se fixer des objectifs personnels. Par exemple, si l'exploitant veut gérer son stock de fourrage pâturable parce qu'il est un peu juste, la hauteur peut se révéler être un indicateur intéressant.

JOSÉPHINE CLIQUET

CAVEB